CATÁLOGO DE PRODUTOS

Linha Avicultura Biovet Vaxxinova

Biovet
vaxxinova

Tradição movida pela inovação.



BIOVET VAXXINOVA
Catálogo de Produtos Avicultura

Com um robusto portfólio para saúde animal, nossa empresa é referência de inovação e qualidade há mais de 60 anos, apresentando uma trajetória pioneira no Brasil e na América Latina. A paixão pela ciência distingue a nossa marca, cujas operações tradicionalmente têm como foco as pessoas e os clientes.

Biovet Vaxxinova tem sede e plantas de produção em Vargem Grande Paulista (SP), e centro de pesquisas e planta de produção em Ibiúna (SP). O investimento em novos conhecimentos e no contínuo aprimoramento da infraestrutura faz parte do DNA da marca *Biovet Vaxxinova*.

Por conta disso, entre outros diferenciais, nossas plantas fabris dispõem do maior laboratório de produção de vacina antirrábica do Brasil, de moderno laboratório para produção de vacina contra aftosa e do único laboratório para produção de vacinas contra coccidiose aviária da América Latina.

Isso assegura o desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de mais de 100 produtos, submetidos a um rigoroso sistema de garantia de qualidade, possibilitando aos médicos veterinários ter à disposição um arsenal para agir na prevenção ou no tratamento de enfermidades que desafiam diferentes segmentos da criação animal, como pecuária, avicultura, suinocultura, aquacultura e animais de companhia.

Nossa empresa integra o grupo *Vaxxinova*, sediado em Nijmegen, na Holanda, que tem operações em mais de 50 países, centros de pesquisa, unidades produtivas e de diagnóstico na Alemanha, Estados Unidos, Itália, Noruega, Japão, Jordânia, além do Brasil. A *Vaxxinova* faz parte da empresa familiar EW Group, sediada na Alemanha.

Essa é a nossa marca desde 1957. Tradição movida pela inovação.

BIO-COCCIVET R

Vacina heptavalente para a prevenção da Coccidiose Aviária, constituída de uma suspensão concentrada de oocistos esporulados com as 7 espécies de eimérias patogênicas: *E. acervulina, E. praecox, E. maxima, E. brunetii, E. necatrix, E. tenella* e *E. mitis*, isoladas de campo no Brasil e multiplicadas em aves livres de agentes patogênicos específicos (SPF). Única vacina do segmento que permite associação com as vacinas virais vivas, e pode ser utilizada como diluente ocular.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal (preferencialmente) ou spray.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 30 mL, correspondentes a 1.000 doses cada.

BIO-COCCIVET

Vacina multivalente atenuada, para prevenção da Coccidiose Aviária, constituída de uma suspensão concentrada de oocistos esporulados de 5 espécies de eimérias*: E. acervulina, E. praecox, E. maxima* (3 cepas), *E. tenella* e *E. mitis,* isoladas de campo no Brasil e multiplicadas em aves livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via spray na planta de incubação.

APRESENTAÇÃO:
Frascos correspondentes a 1.000, 5.000 e 10.000 doses.

GUMBOR-VET

Vacina contra a doença de Gumboro (Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício – IBD), constituída de vírus atenuado (cepa GBV-8), de origem de embrião de galinha, preparado em ovos livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, oral, "in ovo" e subcutânea.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

GUMBOR-VET W2512

Vacina contra a doença de Gumboro (Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício – IBD), constituída de vírus atenuado (cepa Winterfield 2512), de origem de embrião de galinha, preparado em ovos livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000, 2.500 e 5.000 doses.

GUMBOR-VET G603

Vacina contra a doença de Gumboro (Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício – IBD), constituída de vírus atenuado (cepa Moulthrop G603), de origem de embrião de galinha, preparado em ovos livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 2.000 e 5.000 doses.

BIO-BRONK-VET H-120

Vacina viva contra a Bronquite Infecciosa das Aves, constituída da cepa Massachusetts (H-120), preparada em ovos embrionados de galinhas, livres de agentes patogênicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, spray ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

NEW-VACIN (HB1)

Vacina viva contra a doença de Newcastle, constituída da cepa HB1, preparada em ovos embrionados de galinhas, livres de agentes patogênicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, spray ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

NEW-VACIN (LA SOTA)

Vacina viva contra a doença de Newcastle, constituída da cepa La Sota, preparada em ovos embrionados de galinhas, livres de agentes patogênicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, spray ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 e 2.000 doses.

NEW-BRONK VIVA HB1

Vacina viva contra as doenças de Newcastle e Bronquite Infecciosa das aves, constituída de suspensão liofilizada de vírus de Newcastle, cepa HB1, e de vírus de Bronquite Infecciosa das Aves, cepa H-120.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, spray ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

NEW-BRONK VIVA

Vacina viva contra as doenças de Newcastle e Bronquite Infecciosa das Aves, constituída de suspensão liofilizada de vírus de Newcastle, cepa La Sota, e de vírus de Bronquite Infecciosa das Aves, cepa H-120.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

BOUBA DAS AVES (SUAVE)

Vacina viva contra a Bouba das Aves, cepa suave, preparada a partir de amostra de vírus Pox-Galinha em cultura celular de fibroblasto de embrião de galinha livre de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via subcutânea ou "in ovo", podendo ser associada a outras vacinas vivas no incubatório.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 ou 2.000 doses.

BOUBA DAS AVES (FORTE)

Vacina viva contra a Bouba das Aves, cepa forte, preparada a partir de amostra de vírus Pox-Pombo em ovos embrionados de galinhas livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via punção na asa (intradérmica), em aves com, no mínimo, 21 dias de idade.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 doses, acompanhada do respectivo diluente e aplicador.

VACINAS VIVAS
Catálogo de Produtos Avicultura

TREMOR-VET

Vacina viva contra a Encefalomielite Aviária, constituída de vírus vivo atenuado (origem de embrião de galinha), preparada em ovos livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via oral, na água de bebida.

APRESENTAÇÃO:
Frascos de 10 mL com a suspensão de vírus, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-SHS VIVA

Vacina viva atenuada contra o Metapneumovírus Aviário, agente viral da Síndrome da Cabeça Inchada das Aves. Constituída por 2 cepas de Metapneumovírus Aviário do subgrupo A (amostra galinha-SHS 119/95-BR e amostra peru-SHS TRTV-BR), isoladas no Brasil.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal (preferencialmente) ou spray.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 e 2.000 doses.

ARTRI-VET ORAL

Vacina viva atenuada contra o Reovírus Aviário. Constituída pela cepa S 1133 cultivada em cultura celular de embriões de galinhas, livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via oral, na água de bebida, ou ocular/nasal.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 e 2.000 doses.

BIO-GALLINARUM 9R

Vacina viva atenuada contra o Tifo Aviário, constituída de uma suspensão bacteriana de *Salmonella* Gallinarum, cepa 9R. Indicada para prevenção do Tifo e do Paratifo Aviário.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial e codornas.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, na região dorsal do pescoço ou intramuscular na dose de 0,2 mL/ave.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 500, 1.000 e 2.000 doses.

MYCO-GALLI MG-70

Vacina viva atenuada contra a Micoplasmose Aviária, constituída pela amostra *Mycoplasma gallisepticum* MG-70, preparada em meio de cultura sintético.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal ou spray.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 doses.



BIO-MARK-VET C

Vacina viva congelada contra a doença de Marek, constituída de uma suspensão concentrada de HVT (Herpes-Vírus), origem de peru, amostra FC 126, cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet Vaxxinova na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Ampolas congeladas, com 1.000 doses.

BIO-MARK-VET L

Vacina viva liofilizada contra a doença de Marek, constituída de uma suspensão concentrada de HVT (Herpes-Vírus), origem de peru, amostra FC 126, cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet Vaxxinova, na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 e 2.000 doses.

MARK-GUMBOR C

Vacina viva congelada contra as doenças de Marek e Gumboro, constituída de uma suspensão concentrada de HVT (Herpes-Vírus), origem de peru, amostra FC 126, cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF), e de suspensão concentrada de Gumboro, amostra GBV-8, de origem de embrião de galinha SPF.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Ampolas congeladas, com 3.000 doses.

VACINAS VIVAS
Catálogo de Produtos Avicultura

MARK-GUMBOR

Vacina viva liofilizada contra as doenças de Marek e Gumboro, constituída de uma suspensão concentrada de HVT (Herpes-Vírus), origem de peru, amostra FC 126, cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF), e de suspensão concentrada de Gumboro, amostra GBV-8, de origem de embrião de galinha SPF.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet, na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 3.000 doses.

BIO-MARK-VET R

Vacina viva congelada contra a doença de Marek, constituída de uma suspensão concentrada de Herpes-Vírus, amostra CVI-988 CLONE C (Rispens), cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet Vaxxinova, na dose de 0,2 mL por ave.

APRESENTAÇÃO:
Ampolas congeladas, com 1.000 doses.

SB-MARK-VET C

Vacina contra a doença de Marek congelada, constituída de Herpes-Vírus, origem de peru, amostra HVT-FC126, e com Herpes-Vírus, origem de galinha, amostra SB1.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet Vaxxinova, na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Ampolas congeladas, com 1.000 doses.

NEW-BRONK-GUMBOR-REO-SHS

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120) e Gumboro (GBV-8 e 1084-E), cultivadas em ovos embrionados de galinhas SPF, e contra Reovirose (S 1133, 1733 e 2408) e Síndrome da Cabeça Inchada (SHS 119/95-BR e TRTV-BR), cultivadas em células de embriões de galinhas SPF, inativada e microemulsionada.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

NEW-BRONK-GUMBOR-SHS

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120) e Gumboro (GBV-8 e 1084-E), cultivadas em ovos embrionados de galinhas SPF, e contra Síndrome da Cabeça Inchada (SHS 119/95-BR e TRTV-BR), cultivada em células de embriões de galinhas SPF, inativada e microemulsionada.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

NEW-BRONK-GUMBOR-REO

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120) e Gumboro (GBV-8 e 1084-E), cultivada em células de embriões de galinhas SPF, e contra Reovirose (S 1133, 1733 e 2408), inativada e microemulsionada.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

NEW-BRONK-GUMBOR OLEOSA

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120) e Gumboro (GBV-8 e 1084-E), cultivadas em ovos embrionados de galinhas SPF, inativada e microemulsionada.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

VACINAS INATIVADAS
Catálogo de Produtos Avicultura

BIO-ENTERITIDIS

Vacina contra *Salmonella* Enteritidis constituída pelas amostras PT4, PT4a, PT6a, PT7, PT7a e PT9, cultivadas em meio semissintético, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-HEIDELBERG SE

Vacina contra *Salmonella* Heidelberg e *Salmonella* Enteritidis, constituída de culturas de *S.* Heidelberg e *S.* Enteritidis (amostras PT4, PT4a, PT6a, PT7, PT7a e PT9), cultivada em meio semissintético, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-PASTEURELA SE

Vacina contra Cólera Aviária e *Salmonella* Enteritidis, constituída de culturas de *Pasteurella multocida* sorotipo 1 (X-73) e sorotipo 3 (P 1059), e cultura de *S.* Enteritidis, amostras PT4, PT4a, PT6a, PT7, PT7a e PT9, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-PASTEURELA OLEOSA

Vacina contra Cólera Aviária, constituída de culturas de *Pasteurella multocida* sorotipo 1 (X-73) e sorotipo 3 (P 1059), cultivada em meio semissintético e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

SQP-NEW-BRONK-VET OLEOSA

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota) e Bronquite Infecciosa das Aves (H-120), cultivadas em ovos embrionados de galinha SPF, e Síndrome da Queda de Postura (SQP 81), cultivada em ovos embrionados de marrecas, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

NEW-BRONK-VET OLEOSA

Vacina contra doença de Newcastle (La Sota) e Bronquite Infecciosa das Aves (H-120), cultivadas em ovos embrionados de galinha SPF, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-SHS

Vacina contra o Metapneumovírus Aviário, agente viral da Síndrome da Cabeça Inchada das Aves. Constituída por duas cepas do Metapneumovírus Aviário do subgrupo A (amostra galinha-SHS 119/95-BR e amostra peru-SHS TRTV-BR), isoladas no Brasil.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-REO

Vacina contra Reovirose, constituída por três cepas do Reovírus Aviário (S 1133, 1733 e 2408), inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

VACINAS INATIVADAS
Catálogo de Produtos Avicultura

SQP OLEOSA

Vacina contra a Síndrome da Queda de Postura (cepa SQP 81), cultivada em ovos embrionados de marrecas, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-KORIZA-VET

Vacina contra Coriza Infecciosa das Aves, constituída de uma suspensão concentrada de *Avibacterium paragallinarum* dos sorotipos A (cepa 221), B (cepa 222) e C (cepa Modesto), cultivada em meio sintético, inativada e adsorvida em gel de hidróxido de alumínio como adjuvante.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-KORIZA-VET OLEOSA

Vacina contra Coriza Infecciosa das Aves, constituída de uma suspensão concentrada de *Avibacterium paragallinarum* dos sorotipos A (cepa 221), B (cepa 222) e C (cepa Modesto), cultivada em meio sintético, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

GALLY-VAC OLEOSA

Vacina contra Micoplasmose Aviária, constituída de cultura de *Mycoplasma gallisepticum*, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

COLI-AVE OLEOSA

Vacina contra Colibacilose Aviária, constituída de uma suspensão purificada, concentrada e tratada de antígenos "pili", "somáticos" e "endotóxicos" das amostras 01, 02, 035 e 078 de *E. coli*, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso. Produzida com as cepas de maior prevalência na avicultura industrial.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

INTER-MULTI 7

Vacina contra doença de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120), Síndrome da Queda de Postura (EDS-76), Coriza Infecciosa das Aves sorotipos A (cepa 221), B (cepa 222) e C (cepa Modesto) e Síndrome da Cabeça Inchada, constituída por duas cepas de Metapneumovírus Aviário do subgrupo A (amostra Galinha-SHS 119/95-BR e amostra Peru-SHS TRTV-BR), inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

INTER-MULTI 6

Vacina contra doença de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120), Síndrome da Queda de Postura (EDS-76) e Coriza Infecciosa das Aves sorotipos A (cepa 221), B (cepa 222) e C (cepa Modesto), inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

DILUENTE ESPECIAL

O Diluente Especial Biovet Vaxxinova é uma solução formulada estéril, composta de sais minerais e açúcar, utilizada na reconstituição e estabilização das vacinas Biovet Vaxxinova contra a doença de Marek, Bouba das Aves e Gumboro.

APRESENTAÇÃO:
Bolsas plásticas contendo 200, 600, 800 e 1.000 mL.

DILUENTE ESTÉRIL

Diluente estéril colorido para vacinação via gota ocular ou nasal, composto de água tratada por osmose reversa e corante inerte, que facilita a identificação das aves vacinadas. É indicado para reconstituição das vacinas liofilizadas de Newcastle, Bronquite Infecciosa das Aves, Gumboro, Micoplasma, Metapneumovírus Aviário, entre outras.

APRESENTAÇÃO:
Frasco de 30 mL, suficiente para reconstituir 1.000 doses de vacina, acompanhado de bico dosador.

DILUENTE ESTÉRIL

Diluente estéril colorido para vacinação intramuscular, composto de água tratada por osmose reversa e corante inerte, que facilita a identificação das aves vacinadas. Está indicado para reconstituição da vacina liofilizada de *Salmonella* Gallinarum, cepa 9R.

APRESENTAÇÃO:
Frasco de 200 mL, suficiente para reconstituir 1.000 doses de vacina.

DILUENTE SPRAY

O Diluente Spray é composto de água tratada por osmose reversa, sais minerais e peptonas, e concentrações adequadas para reconstituição e estabilização das vacinas contra Newcastle, Bronquite Infecciosa das Aves, Gumboro, Micoplasma, Metapneumovírus Aviário, entre outras. A inclusão de corante auxilia na indicação de eventuais alterações de pH do meio.

APRESENTAÇÃO:
Frasco de 200 mL, suficiente para reconstituir 1.000 doses de vacina.

LEVUCELL SB

Levucell SB é um aditivo probiótico composto pela levedura viva *Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I 1079*, com efeito probiótico, desenvolvido para melhorar os parâmetros produtivos e desempenho zootécnico das aves. Promove o equilíbrio da microbiota intestinal, estímulo da imunidade local e desenvolvimento da maturidade intestinal, fortalecendo a função de barreira para uma melhor resistência a hospedeiros indesejáveis.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Levucell SB deve ser administrado na ração, sendo duas as formulações disponíveis:

LEVUCELL SB 20: indicado para rações fareladas.
CONCENTRAÇÃO: 2,0 x 10^{10} UFC/grama de produto.
DOSE RECOMENDADA: 100 gramas/tonelada de ração.
APRESENTAÇÃO: embalagens aluminizadas de 4 kg e de 20 kg.

LEVUCELL SB 10 ME TITAN: forma microencapsulada, indicada para rações peletizadas.
CONCENTRAÇÃO: 1,0 x 10^{10} UFC/grama de produto.
DOSE RECOMENDADA: 200 gramas/tonelada de ração.
APRESENTAÇÃO: embalagens aluminizadas de 4 kg e de 20 kg.

PEDIOFLORA AVES

Pedioflora Aves é um aditivo probiótico, composto pela bactéria *Pediococcus acidilactici MA 18/5 M*, com forte propriedade de conversão de açúcares não digeríveis em ácido lático, promovendo melhor digestibilidade do alimento ingerido. A diminuição do pH, promovida pela produção de ácido lático, limita o desenvolvimento de bactérias patogênicas, ao mesmo tempo em que favorece um maior desenvolvimento da flora benéfica. Proporciona melhoria nos parâmetros produtivos e desempenho zootécnico das aves.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Pedioflora Aves pode ser administrado na ração ou na água de bebida.

DOSE RECOMENDADA:
RAÇÃO: 50 gramas/tonelada de ração.
ÁGUA DE BEBIDA: 25 gramas/1.000 litros de água.
CONCENTRAÇÃO: 2,0 x 10^{10} UFC/grama de produto.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem aluminizada de 5 kg e balde plástico de 20 kg.

PEDIOFLORA VITA

PEDIOFLORA VITA é um suplemento hidrossolúvel que possui em sua composição vitaminas, aminoácidos, eletrólitos e probiótico (*Pediococcus acidilactici MA 18/5M*), com indicação de uso para aves e suínos nas diferentes fases de desenvolvimento. Repõe possíveis deficiências de aminoácidos, vitaminas e eletrólitos, e, administrado continuamente, contribui para o equilíbrio e manutenção da microflora intestinal de aves e suínos, auxiliando na redução de microrganismos indesejáveis.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial, frangos de corte e suínos.

ADMINISTRAÇÃO:
Pedioflora Vita pode ser administrado na ração ou na água de bebida.

DOSE RECOMENDADA:
RAÇÃO: 400 gramas/tonelada de ração.
ÁGUA DE BEBIDA: 200 gramas/1.000 litros de água.

COMPOSIÇÃO:
Vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina C, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, niacina, metionina, lisina, colina, cloreto de sódio, cloreto de potássio, citrato de sódio, glicose em pó, aditivo probiótico, antioxidante, antiaglomerante e veículo.

APRESENTAÇÃO:
Sachês de 200 gramas.

PULOR TESTE

Antígeno para diagnóstico de infecção por *Salmonella* Pullorum ou *Salmonella* Gallinarum, em galinhas e perus, por reação de soroaglutinação ou hemaglutinação, pelo método rápido em placa. Trata-se de um teste qualitativo que detecta a presença de aglutininas (anticorpos) no sangue ou soro das aves infectadas por *S.* Pullorum ou *S.* Gallinarum. Preparado com cultura de *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, amostra H95.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 10 mL, correspondentes a 200 testes.

PROTECLOR C

Pastilha neutralizadora de cloro com marcador de soluções vacinais, na coloração azul, para preparo de vacinações. Indicada para inativação de 10 ppm de cloro em 100 litros de água e 5 ppm de cloro em 200 litros de água.

APRESENTAÇÃO:
Balde plástico com 100 pastilhas.

VACINAÇÃO POR VIA ORAL

A vacinação por via oral (água de bebida) exige que alguns cuidados sejam tomados com relação à higiene dos bebedouros, temperatura e qualidade da água, que deve estar livre de desinfetantes químicos, uma vez que estes podem interferir na viabilidade da vacina. Observar ainda as seguintes recomendações:
– Os bebedouros devem estar limpos e sem resíduos de sabão, detergentes, desinfetantes e/ou outros produtos químicos;
– Suspender o uso de medicamentos ou desinfetante na água de beber 24 horas antes e 24 horas depois da vacina;
– Suspender o fornecimento de água uma ou duas horas antes (dependendo da temperatura ambiente) da vacinação, a fim de estimular o rápido consumo da água com a vacina;
– Utilizar PROTECLOR C (seguindo as informações técnicas) no sistema de água de bebida, para que o cloro seja inativado e, assim, não interfira na viabilidade da vacina;
– Enxaguar várias vezes o frasco da vacina, a fim de recuperar possíveis resíduos;
– Não administrar água de bebida até que toda a água contendo a vacina seja consumida, o que deve ocorrer no período máximo de duas horas;
– Não expor os bebedouros com a vacina diluída à luz solar.

OUTROS
Catálogo de Produtos Avicultura

O compromisso do Laboratório Biovet Vaxxinova com a avicultura nacional vai além da fabricação de produtos biológicos de qualidade superior. Em vários momentos de sua história, a empresa tem mantido importante colaboração com o mercado, como em 2006, por exemplo, por meio do fornecimento de aves sentinelas que foram indispensáveis para comprovar o fim do surto da doença de Newcastle em criação de aves não industrializadas no Rio Grande do Sul, que causou prejuízos à indústria avícola de todo o País. Isso só foi possível graças à existência dos dois aviários SPF (livre de agentes patogênicos específicos – specific pathogen free) do Laboratório Biovet Vaxxinova.

Notoriamente, os ovos SPF são indispensáveis para produção, controle de qualidade das vacinas e para exames laboratoriais na avaliação de algumas doenças. No Brasil, o Biovet Vaxxinova é o único fabricante de produtos biológicos a deter o processo de produção de aves e ovos SPF (em dois aviários próprios), com credenciamento pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), aprovado como parte integrante da licença de funcionamento da empresa, desde 1979, e com licença específica de aviário SPF desde 1993.

Ovos livres de patógenos específicos (specific pathogen free – SPF) são ovos obtidos de aves livres de patógenos específicos, mantidos em ambiente com sistemas de ar filtrado, pressão positiva e biossegurança. A utilização de aves e ovos SPF é de extrema importância à indústria da saúde animal, por ser peça fundamental aos seguintes processos:

A. PRODUÇÃO DE VACINAS AVIÁRIAS: o ovo SPF é importante na produção de vacinas avícolas vivas, pelo fato de que esse produto é livre de agentes patogênicos específicos de galinhas, portanto, não é capaz de produzir doenças em aves. Com isso, tem-se a segurança de que, ao vacinar aves com vacinas produzidas em ovos SPF, essa vacina não se constituirá em uma fonte de transmissão de doenças, e sim em uma promotora de uma resposta imune desejada no organismo das aves, formando anticorpos protetores. De igual importância é a produção de vacinas inativadas com ovos SPF, uma vez que, mesmo sendo as vacinas “mortas”, elas são consideradas seguras;

B. PESQUISA E DIAGNÓSTICO: para esta finalidade, as aves ou ovos devem ser livres dos patógenos virais ou bacterianos que poderiam mascarar os resultados;

C. AVES SENTINELAS: embora não seja uma prática muito utilizada no Brasil, são utilizadas no controle epidemiológico de doenças infecciosas;

D. PRODUÇÃO DE ALGUMAS VACINAS HUMANAS: no Brasil, principalmente sarampo e febre amarela.

SAC
Serviço de Atendimento
ao Cliente – Biovet Vaxxinova
0800 55 66 42

facebook
/biovet.sa

Biovet
vaxxinova